

HGPO – O’Sullivan

Tests d’hyperglycémies provoquées

Indications :

Tests fréquemment demandés dans le cadre d’un suivi de grossesse, entre la 24ème et la 28ème semaine d’aménorrhée, dans le dépistage du diabète gestationnel. Attention à l’intitulé de la demande !

- « **O’Sullivan 75g** » 2h ou « **HGPO 75g** » **LE PLUS FREQUENT** et le **seul recommandé par les protocoles**

Effets indésirables possibles :

Nausées, sensation de malaise, vomissements (en cas de vomissement, l’examen sera annulé car les résultats seraient biaisés)

Conditions de prélèvement :

On prélève d’abord la glycémie à jeun (sur tube GRIS - fluoré)

- On fait boire à la patiente les 75g de glucose
- **Elle reste au laboratoire assise** (elle peut aller aux toilettes) en n’ayant le droit de ne boire que de l’eau si elle en veut. Elle ne peut partir « se balader » puis revenir car toute activité physique entrainera une consommation d’énergie et donc de sucre, ce qui faussera le résultat des analyses

On prélève ensuite sur tube GRIS :

- **La glycémie à 1h**
- **La glycémie à 2h**

Important : Bien identifier chaque tube en mettant bien

« T0 » (ou « à jeun »)

« T60 » ou « 1h »

« T120 » ou « 2h »

Ou, si vous êtes au laboratoire, utiliser les étiquettes pré-imprimées